

## Therapieanleitung Embryotransfer mit kryokonservierten Eizellen

1. Es wird empfohlen, 1 Tablette Folsan 0,4mg täglich einzunehmen.
2. Sie möchten nun einen Embryotransfer mit den von Ihnen imprägnierten, kryokonservierten Eizellen durchführen lassen.
3. Bitte melden Sie sich telefonisch einige Tage vor der erwarteten Menstruation:  
Telefon: (06441) 200 20 20, Fax: (06441) 200 20 299,  
E-Mail: [info@ivf-mh.de](mailto:info@ivf-mh.de).
4. Sie erhalten dann von uns einen Stimulationsplan sowie die Rezepte zugeschickt. Sehen Sie sich den Stimulationsplan genau an, und besorgen Sie bitte inzwischen die Medikamente aus der Apotheke.
5. Tragen Sie den ersten Blutungstag in Ihren Patientenpass ein und vereinbaren Sie mit uns einen Kontrolltermin.
6. Bitte nehmen Sie entsprechend der Angaben in Ihrem Patientenpass die Progynova-Tabletten ein.
7. Beim vereinbarten Ultraschalltermin werden wir kontrollieren, ob sich die Schleimhaut wie gewünscht aufbaut.
8. Lösen Sie den Einsprung mit der angegebenen Dosis hCG (1 Ampulle Ovitrelle oder 2 Ampullen Predalon 5000) zur von uns vorgegebenen Zeit aus.
9. Am darauf folgenden Tag erfahren Sie telefonisch das Auftausergebnis von unseren Labormitarbeitern und vereinbaren den Termin für den Embryotransfer.
10. Kommen Sie bitte mit Ihrem Partner zu diesem Termin in unser Kinderwunschzentrum für den Embryotransfer mit kryokonservierten Eizellen.
11. Beginnen Sie bitte nach dem Embryotransfer mit dem Einführen von täglich 1 Crinone (abends vor dem Schlafengehen) und 1 Tbl. ASS 100 – bis zum Schwangerschaftstest.
12. Die Progynova-Tabletten nehmen Sie bitte weiterhin ein, wie es in Ihrem Patientenpass vermerkt ist.
13. Kommen Sie bitte 14 Tage nach dem Embryotransfer zur Blutentnahme für den Schwangerschaftstest in unserem Kinderwunschzentrum. Sie können diese Blutentnahme auch bei Ihrem Frauenarzt durchführen lassen und uns das Ergebnis mitteilen.
14. Bei negativem Schwangerschaftstest beenden Sie bitte die Einnahme von Crinone und ASS 100. Es folgt dann eine Regelblutung.  
Anschließend sollte einen Monat Pause eingehalten werden.
15. Bei positivem Schwangerschaftstest nehmen Sie das Crinone bitte weiter (bis ca. 6. SSW) und vereinbaren einen Ultraschalltermin bei Ihrem Gynäkologen.